

# PRODUKTDATABLAD

## Oral Impact Pulver

Oral Impact pulver er ernæringsmæssigt fuldgældigt og velegnet til ernæringsmæssig håndtering af patienter i risiko for underernæring i den præ- og postoperative fase. Oral Impact indtages oralt eller som sondeernæring. Anvendes under lægeligt tilsyn.

Oral Impact indeholder arginin, omega-3 og nukleotider, der reducerer antallet af postoperative infektioner, komplikationer og antallet af indlæggelsesdage.<sup>1-2</sup>

Produktet er et levnedsmiddel til særlig medicinsk formål.

### REFERENCER:

1. Chevrou-Séverac H et al. Cost-effectiveness analysis of immune-modulating nutritional support for gastrointestinal cancer patients. *Clinical Nutrition* 2013 Sep 13.
2. Drover JW et al. Perioperative use of arginine-supplemented diets: a systematic review of the evidence. *Am Coll Surg.* 2011 Mar.



### Ingredienser:

Sakkarose, valleprotein (**mælk**), maltodextrin, L-arginin, **fiskeolie**, fiber (guargummi), mineraler (kaliumcitrat, natriumchlorid, calciumphosphat, magnesiumcitrat, kaliumphosphat, jernsulfat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, chromchlorid, kaliumiodid, natriumselenit, natriummolybdat, natriumfluorid), mellemkædetriglycerid (MCT), majsolie, surhedsregulerende middel (E330), RNA ekstraheret fra gær, stabilisator (E415), cholinbitartrat, emulgator (**sojalecithin**), vitaminer (C, E, pantothenyrsyre, niacin, B6, thiamin, riboflavin, A, folinsyre, D, K, biotin), aroma, antioxidanter (E304, E306, E307, indeholder **sojalecithin**), farvestof (rødbede, beta-caroten).

### Indikation:

Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af patienter i risiko for underernæring i den præ- og postoperative fase.

### Doseringer:

Præoperativt: 3 poser dagligt som supplement i 7 dage. Postoperativt: 4–5 poser dagligt i min. 7 dage ved underernæring. Anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist. Brevets indhold opløses i 250 ml vand (kogt og afkølet) ved hjælp af shaker, piskeris eller gaffel, og skal drikkes umiddelbart derefter.

### Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt uden direkte sollys. Tilberedt produkt opbevares tildækket og anvendes indenfor 6 timer opbevaret ved stuetemperatur eller 24 timer opbevaret i køleskab.

### Holdbarhed:

Se datomærkning på emballagen. Tilberedt produkt anvendes indenfor 24 timer opbevare tildækket i køleskab.

### Bortskaffelse:

Indhold bortskaffes som bioaffald. Emballage bortskaffes som restaffald.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7464102	Oral Impact	tropical pulver	74 g	pk. á 5 x 74 g / krt. á 6 pk.	12268885

### For sundhedsfagligt personale

# PRODUKTDATABLAD

## Oral Impact Pulver

Næringsindhold		Pr. 100 g pulver	Pr. 74 g pulver
<b>ENERGI</b>			
	kJ	418	309
	kcal	1763	1304
<b>FEDT (21 E%)</b>	g	10	7,4
Mættet fedt	g	5,1	3,8
MCT	g	3,0	2,2
Monoumættet fedt	g	2,1	1,5
Polyumættet fedt	g	3,2	2,4
Omega-3	g	1,3	0,96
<b>KULHYDRAT (54 E%)</b>	g	56	41
Sukkerarter	g	30	22
Laktose	g	1,2	0,89
<b>PROTEIN (23 E%)</b>	g	24	18
L-arginin	g	5,1	3,8
<b>FIBRE (2 E%)</b>	g	4,1	3,0
<b>SALT</b>	g	-	-
<b>MINERALER</b>			
Natrium	mg	434	321
Kalium	mg	543	402
Klorid	mg	608	450
Calcium	mg	324	240
Fosfor	mg	292	216
Magnesium	mg	70	52
Jern	mg	4,9	3,6
Zink	mg	5,0	3,7
Kobber	mg	0,69	0,51
Mangan	mg	0,81	0,60
Fluor	mg	0,54	0,40
Selen	µg	25	18
Krom	µg	41	30
Molybdæn	µg	50	37
Jod	µg	61	45
<b>VITAMINER</b>			
Vitamin A	µg	520	385
Vitamin D	µg	4,2	3,1
Vitamin E	mg	12	8,9
Vitamin K	µg	27	20
Vitamin C	mg	105	78
Vitamin B <sub>1</sub>	mg	0,49	0,36
Vitamin B <sub>2</sub>	mg	0,80	0,59
Niacin	mg / mg NE	1,7 / 6,5	1,3 / 4,8
Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,70	0,52
Folinsyre	µg	140	104
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	2,5	1,8
Biotin	µg	20	15
Pantothensyre	mg	4,0	3,0
<b>ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER</b>			
Kolin	mg	165	122
Nukleotider	mg	600	444
<b>VAND</b>	ml	-	-
Osmolaritet	mosmol/l	520	-
Osmolalitet	mosmol/kg H <sub>2</sub> O	620	-