

PRODUKTDATABLAD

Panodil

Panodil (500 mg) virker smertestillende og febernedsættende.

Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.



Ingredienser:	Paracetamol, Majsstivelse, pregelatineret stivelse, povidon, kaliumsorbat, talcum, stearinsyre, hypromellose og triacetin.
Indikation:	Anvendes mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 2 tabletter på 500 mg (i alt 1000 mg) 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8 tabletter (4000 mg) i døgnet. I enkelte tilfælde kan 1 tablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Der bør der minimum være et doseringsinterval på 4 timer mellem hver dosering.
Dosering:	Hos børn mellem 2-11 år fastsættes den anbefalede dosis ud fra vægt. Doseringstabel børn 2-11 år fremgår på indlægssedlen. Hos børn bør der minimum være doseringsinterval på 6 timer mellem hver dosering. Det anbefales, at børns behandlingsperiode ikke overskrider 3 dage. Børn under 2 år må ikke anvende Panodil. Følg altid lægens anvisning
Kontraindikationer:	Overdosis kan medføre alvorlig leverinsufficiens. Må ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).
Advarsler og forsigtighedsregler:	Panodil indeholder paracetamol. Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der

PRODUKTDATABLAD

Panodil

er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.

Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager Panodil mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Panodil. Det kan have betydning for resultaterne.

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin.

Opbevaring:	Opbevar Panodil utilgængeligt for børn og ved Opbevar Panodil utilgængeligt for børn.
Holdbarhed:	Se holdbarhedsdato på emballagen.
Håndtering og destruktio:	Aflever altid medicin rester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7551000	Panodil	Håndkøbsmedicin tabletter HX	500 mg	Æske a 10 stk.	005813

ANSVARLIGT FIRMA

Scanpharm A/S, Topstykket 12, 3460 Birkerød